


Avertissements agricoles



ISSN 0759 4604

PROVENCE ALPES COTE D'AZUR



MINISTERE DE L'AGRICULTURE DIRECTION DE LA QUALITE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

B P 95 84140 MONTFAVET

Téléphone (90) 88.21.83.

ARBORICULTURE - CULTURES LEGUMIERES - GRANDES CULTURES -

28 Juillet 1986 - N°16

ARBORICULTURE

TOUTES ESPECES

ACARIENS ROUGES - SURVEILLER LA POPULATION .

Abaissier celle-ci si nécessaire avant la mi-Août, date de dépôt des premiers oeufs hivernants et abaissement du seuil à 45 % de feuilles habitées.

COSSUS GATE-BOIS - RENOUELER LA PROTECTION SI NECESSAIRE.

ARBRES FRUITIERS A PEPINS

CARPOCAPSE DES POMMES et DES POIRES - MAINTENIR LA PROTECTION

...sur les espèces et variétés devant être récoltées après le 5 Août. Les captures demeurent en général faibles actuellement. Une reprise importante est signalée à Avignon.

ZEUZERE - RENOUELER LA PROTECTION .

En cas d'attaques observées et plus particulièrement en vergers jeunes et non encore productifs, on préférera alors le mévinphos.

ODIUM - PROTEGER LES JEUNES POUSSES,

dans les vergers irrigués ou ceux dont la végétation est encore active.

MINEUSE CERCLEE -

Le prochain vol devrait débuter vers le 30 Juillet. Prévoir un traitement préventif vers le 1er Août (type klartan). Avec un larvicide (type méthomyl) l'intervention pourra être retardée jusqu'aux premières éclosions, c'est-à-dire vers le 7-8 Août.

En cas de modification de ces dates un bulletin fera le point.

EULIA -

Sur pommes et poires en 1985 on avait observé de fortes attaques (dégâts analogues à ceux de Pandémis). Cette année le traitement avec INSEGAR a limité les populations. On sera attentif à toute attaque éventuelle. Si nécessaire intervenir avec un pyrèthrinofide sur des larves de moins de 1 cm.

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - PROTEGER LES VARIETES SENSIBLES DE COGNASSIERS,

et observer les premières attaques éventuelles pour intervenir.

ARBRES FRUITIERS A NOYAU

TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER - TRAITER EN FONCTION DE LA DATE DE RECOLTE.

La protection doit être soignée, de fortes attaques étant possibles .

CARPOCAPSE DES PRUNES - RENOUELER LA PROTECTION.

Ici aussi la protection doit être sans faille, à cause d'attaques plus intenses que d'habitude.

P. 167

OLIVIER

MOUCHE DE L'OLIVE -

Un bulletin spécial a fait démarrer la protection curative sur le littoral varois dès le 26 Juillet. Ailleurs, attendre encore.

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DU MELON -

Cette maladie est due à un champignon. Elle provoque le dessèchement des feuilles qui se recroquevillent. Le matin, le dessous des taches est recouvert par un feutrage couleur olivâtre. Il ne faut pas confondre cette maladie avec la "grille physiologique". L'attaque s'est généralisée autour des foyers initiaux : Berre, Pertuis. Les risques sont, importants en toutes zones.

Dans les parcelles attaquées ou voisines d'un foyer de mildiou, effectuer deux traitements à 8 jours d'intervalle, puis maintenir la protection tous les 8 jours.

Ailleurs, effectuer un traitement par pulvérisation tous les 10-12 jours.

Produits utilisables

. chlorothalonil	(DACONIL)	150 g M.A./hl
. mancozèbe	(Nombr. spécialités)	200 g M.A./hl
. métirame de zinc	(POLYRAM)	200 g M.A./hl
. oxadixyl + mancozèbe + cymoxanil	(PULSAN)	utilisable en curatif - faire un essai préalable pour vérifier la non phytotoxicité du produit.

Respecter un délai de 10 jours avant récolte.

CHENILLE A FOURREAU DE L'ASPERGE -

Les éclosions continuent. Renouveler le traitement suivant le produit utilisé (voir notre bulletin N°14).

Effectuer une pulvérisation abondante (2000 l/ha au moins) et localisée à la base des tiges sur lesquelles la bouillie doit ruisseler.

TEIGNE DU POIREAU -

Rappel - (voir nos bulletins 12 et 14) .

TEIGNE DE LA POMME DE TERRE -

Afin d'éviter que les chenilles puissent atteindre les tubercules, il est conseillé de maintenir une humidité suffisante du sol pour qu'il ne se fissure pas (irrigation par aspersion).

Récolter les parcelles à maturité le plus rapidement possible sans jamais laisser séjourner les pommes de terre sur la parcelle.

Les locaux de stockage doivent être nettoyés et fermés.

MOUCHE DU CHOU SUR NAVET -

Vol nul .

MOUCHE DE LA CAROTTE -

Vol nul.

SERRES et ABRIS

NOCTUELLE DE LA TOMATE (Heliothis armigera)

Assurer la protection sur les tomates ayant au moins un bouquet fleuri.

Dans les exploitations menées en lutte biologique utiliser le bacillus thuringiensis (Bactospéine 16000 P.M. à 1 kg de produit commercial/ha).

Le traitement sera renouvelé tous les 8 jours pendant la période de risque.

La fermeture des ouvrants et portes avant la tombée de la nuit permet aussi de limiter très fortement l'arrivée des papillons et donc les dégâts possibles.

ACARIOSE BRONZEE DE LA TOMATE -

Des attaques sont possibles. Intervenir rapidement après détermination de l'ennemi avec dicofol (KELTHANE, CARBAX, REMADION, etc ...) à 50 g M.A./hl.